

東園國小校園莫德納疫苗接種重要說明

- 時間：111年5月10日(二)08:30-11:30(預計)

- 地點：體操館



- 單位：南門醫院



學生請穿輕便短袖服裝



當天攜帶：一定要帶健保卡、接種黃卡(未打過第一劑者當日發放，滿12歲打第2劑者定要將黃卡帶過來)

東園國小校園莫德納疫苗接種流程


集合區

等待區

評估區


注射區

觀察區



莫德納疫苗施打動線圖

新竹市立東園國小 莫德納疫苗接種-體操館場地動線圖



東園國小校園COVID-19疫苗接種

接種疫苗前必讀攻略



前一天不熬夜

穿著寬鬆短袖

接種前確認
身體是否不適

接種後
休息30分鐘



請幫忙提醒孩子!

中央流行疫情指揮中心

校園莫德納疫苗接種注意事項(一)

施打前



校園莫德納疫苗接種注意事項(二)

施打前

- 接種者本周應健康作息及飲食，前一天更要有**充足睡眠、不要熬夜**。
- 避免在**空腹及脫水**的情況下接種疫苗。
- 請導師協助多提醒學生注意事項。




校園莫德納疫苗接種注意事項(三)

施打當日

- 5/10當日，穿著**短袖輕便服裝**並攜帶**健保卡**
(一定要帶沒有健保卡不予施打)。
- 一定吃早餐或與午餐，或者帶些點心或餅乾
- 各班級依報到時間準時到校。

第一關-集合區(體操館內)

- 報到點名、集合時依座號排好、確認有帶健保卡、黃卡、家長同意書。
- 完成量測體溫並記錄於意願書跟班級名冊內。



校園莫德納疫苗接種注意事項(四)

施打當日

第二關-報到區(體操館內)

- 聽取說明，保持安靜。
- 發下**意願書**及**接種卡**(黃卡)【確認資料是否有誤】
- 核對健保卡查詢全國疫苗接種紀錄、確認未施打疫苗
- 完成健保卡讀卡報到
- 蓋章:同意書跟疫苗黃卡



校園莫德納疫苗接種注意事項(五)

施打當日

第三關-醫師評估區(體操館內)

- 學生手持**意願書、接種卡、健保卡**
- 配合醫師問診，若有身體不適或其他問題皆要反映。
- 醫師若評估不適合施打者，交回意願書及健保卡退刷後，請回至班級休息。

校園莫德納疫苗接種注意事項(六)

施打當日

第四關-注射區(體操館內)

- 配合護理人員進行施打疫苗。
- 一般都是打在左手臂(非慣用手)，若有疑問現場可立即說明。
- 如有臨時不施打或特殊狀況，務必明確說明，校方不會強迫施打，通知家長知悉。



校園莫德納疫苗接種注意事項(七)

施打當日

第五關-場內休息區(15分鐘在體操館內)


- 以班上最後一員回到休息區就座後開始計時
- ➡ 觀察15分鐘，期間有任何身體不適請告知現場師長。
- 疫苗施打後避免學生落單，要上廁所者，請兩人一同前往。
- 15分鐘觀察結束，同班級學生一起結伴回教室，低年級同學由志工或現場人員陪同返回教室，請班級導師協助發給有打針學生**疫苗注射後注意事項**。



校園莫德納疫苗接種注意事項(八)

施打接種後

- 請學生務必將「COVID-19疫苗學生接種後注意 事項暨接種通知單」帶回家給家長詳閱。
- 若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，約1-2天後可自行痊癒。
- 接種後2周內，請該班導師協助有施打疫苗學生校內體育課調整至室內靜態課程，避免劇烈運動產生不良反應。
- 接種後學生若有需要可申請「疫苗假(自施打當日算起)」，以3天為原則(必要時得延長)，不列入缺席紀錄。



東園國小校園COVID-19疫苗接種

新冠疫苗接種指南

莫德納Moderna篇

兩劑須間隔 28 天



接種的行前準備

- ✓ 確認接種時間、地點
- ✓ 備妥健保卡、通知書、相關證件
- ✓ 多喝水、均衡飲食
- ✓ 檢視身體狀況
 - ※有感冒、泌尿道感染、急性感染、慢性病控制不良等情況**不建議施打**
- ✓ 考慮備藥、排休

接種後注意事項

- ✓ 壓住止血1-2分鐘
- ✓ 留觀15-30分鐘，**沒有不適再回家**
- ✓ 可以冰敷**不要揉**
- ✓ 均衡飲食、攝取優質蛋白質
- ✓ 定時量體溫、多喝水、多休息

常見副作用 & 應對方式

 發燒、發寒 可吃退燒藥緩解症狀	 疲倦 多休息喝水，補充適量維生素
 肌肉痛、頭痛、關節痛 可吃止痛藥緩解症狀	 嚴重副作用(罕見) • 嚴重過敏反應 • 心肌炎、心包膜炎
 注射部位紅、腫、痛 冰敷患部，不可按壓搓揉	

出現以下狀況之一，請儘速就醫

■ 嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇	■ 下肢腫脹或疼痛
■ 嚴重且持續腹痛超過24小時以上	■ 皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等
■ 嚴重胸痛或呼吸困難	

★詳細資料請參見學生接種須知，並謹慎留意。

資料來源: CDC官網

東園國小校園COVID-19疫苗接種

「青少年COVID-19疫苗接種後發生疑似不良事件後送責任醫院」 急診就醫諮詢窗口

更新日期：111.01.27

北區 (12)	新竹市 (2)	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院	單位：兒科急診 24小時專線：03-5326151#4213
		台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	單位：護理部 24小時專線：03-5745098(週一至週五), 0975837365(假日及夜間)
	新竹縣 (2)	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院	單位：兒科部 24小時專線：03-6677600 #531970 單位：急診 24小時專線：03-6677600 #532326
		東元醫療社團法人東元綜合醫院	單位：兒科部 24小時專線：03-5527000#6001、6002, 0988563773

★詳細資料請參見學生接種須知，並謹慎留意。

資料來源: CDC官網

出現發燒或呼吸道症狀



發燒



咳嗽



流鼻水




喉嚨痛

請

戴口罩

當口罩有髒汙、潮濕
或破損時應立即更換



勤洗手

請以肥皂和水或
酒精性乾洗手液清潔雙手

◆提醒您，疫苗接種
雖可降低罹患
COVID-19機率，
但還是有可能感染，
所以平日仍須做好
戴口罩、勤洗手的
防疫措施喔！



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWDCDC

疫情通報及關懷專線：1922



持續落實防疫

守護你我健康

